

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-6-63 258865

**BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

**EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS**

Tél. 88.56.15  
88.06.15

**ABONNEMENT  
ANNUEL**

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative rue Dupetit-Thouars - 49043 ANGERS CEDEX

C. C. P. Nantes 86-04-02

30 Frs

BULLETIN N° 15 DE JUIN 1974 -

TOUS DEPARTEMENTS..... p. 1

## VIGNE

### MILDIOU

Vignobles de la Loire Atlantique et vignobles de Muscadet de Maine et Loire - Les risques d'attaques demeurent faibles, le mildiou est très peu virulent. Il pourrait le devenir à la suite des récentes pluies d'orage. La végétation s'étant accrue depuis le dernier traitement, il y a lieu d'effectuer une nouvelle application dès réception de cette note.

Autres vignobles - Dans les parcelles où aucune protection contre le mildiou n'a encore été réalisée, il est prudent d'exécuter un traitement dans le courant de cette semaine.

### VERS DE LA GRAPPE

Vignobles de la Loire Atlantique - L'activité de la *Cochylis* et de l'*Eudémis* est très faible. Quelques rares oeufs ont été déposés localement; ils sont actuellement éclos et les tout premiers dégâts peuvent être observés. En conséquence, du fait de sa rareté, les viticulteurs devront vérifier la présence du parasite, et n'ajouter un insecticide à la bouillie anti-mildiou que dans les seuls endroits où de jeunes "toiles" sont visibles sur de nombreuses grappes.

## ARBRES FRUITIERS

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Dans les vergers du Nord de la Sarthe et de la Mayenne, il y a lieu d'effectuer un premier traitement à la fin de la semaine en cours.

Dans les vergers du Nord de la Loire Atlantique, ce premier traitement pourra être repoussé aux premiers jours de la semaine du 17 au 22 Juin.

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - Dans le Nord de la Loire Atlantique, de la Sarthe et de la Mayenne, les projections d'ascospores sont terminées. Des taches sont cependant encore susceptibles d'apparaître vers la mi-juin. Une intervention, qui pourra être réalisée à l'occasion du traitement anti-carpocapse, ne se justifie donc que dans les vergers où des taches auront été observées.

### OIDIUM DU POMMIER - ARAIGNEE ROUGE - PUCERONS (en particulier puceron cendré) PSYLLES -

Les inscriptions données dans la note du 5 Juin sur ces parasites, sont applicables aux vergers du Nord de la Loire-Atlantique, de la Sarthe et de la Mayenne.

## POMME DE TERRE

MILDIOU - Les premières taches ont été décelées dans le Nord de la Mayenne. Par conséquent: dans le Nord du département de la Loire Atlantique, dans l'ensemble des départements de la Sarthe et de la Mayenne, il y a lieu d'effectuer un premier traitement contre le mildiou dès réception de cette note.

Dans les autres régions il est encore trop tôt pour intervenir. La Station donnera en temps utile de nouvelles informations.

DORYPHORE - Dans les régions où un traitement dirigé contre le mildiou s'impose, on pourra profiter de cette application pour ajouter un insecticide actif contre le doryphore à la bouillie anti-mildiou.

Dans les autres régions, un traitement contre cet insecte ne se justifie actuellement que dans les parcelles où la présence du parasite aura été repérée.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire des "PAYS DE LA LOIRE"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 11 JUIN 1974